

## AGITAR BIEN ANTES DE USAR

### DOSIFICACIÓN: Vía oral.

Bovinos: 1 mL por cada 12.5 kg (12 mg de Triclabendazole por kg de p.v.). En la práctica 4 mL/50 kg p.v.

Equinos, ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL por cada 15 kg (10 mg de Triclabendazole por kg/p.v.).

**PERIODO DE RETIRO:** Carne: 28 días, leche: No administrar en hembras productoras de leche para el consumo humano.

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No se recomienda su uso en animales debilitados o en simultáneo con baños o vacunaciones. Agitar antes de usar.

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. No someter a temperaturas extremas.

### Mantener alejado del alcance de los niños.

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderón O. CMVP 2944  
Reg. SENASA Perú: F.08.02.N.242  
Costa Rica: Reg MAG.PE2-42-15-2998

Fabricado en el Perú para Agrovvet Market S.A.



**agrovvetmarket**  
animalhealth

Trivantel® es una marca registrada de Agrovvet Market S.A.

SUSPENSIÓN ORAL

USO VETERINARIO

# Trivantel® 15

Triclabendazole 15%



Controla  
Fasciola (Alicuya) en  
TODOS sus estadios  
A LA MAS ALTA  
CONCENTRACIÓN  
15%

Antiparasitario Interno de Acción Total sobre *Fasciola hepatica*.  
Uso en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos y Equinos



**agrovvetmarket**  
animalhealth

### FORMULACIÓN:

Cada 100 mL contienen:  
Triclabendazole 15 g  
Excipientes c.s.p. 100 mL



### INDICACIONES:

**Trivantel® 15** es un antiparasitario de acción total; para el control y tratamiento de la *Fasciola hepatica* (Alicuya); incluyendo casos de fasciolosis aguda, subaguda y crónica, de vacunos, ovinos, caprinos, camélidos y equinos.

Su acción elimina las formas maduras e inmaduras (incluidas las inmaduras precoces) de: *Fasciola hepatica* (Alicuya).

### SEGURIDAD

**Trivantel® 15** es completamente seguro hasta 20 veces la dosis recomendada. Puede usarse sin ningún problema en hembras preñadas y animales jóvenes.

# Trivantel® 15

**El triclabendazole de  
más alta concentración**